

## **Az OGYÉI FoNo VII-1/2017. sz. közleménye**

a Szabványos Vényminták VII. kiadásának módosításáról

A Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. kiadásának alkalmazásáról szóló 64/2004. (VII. 27.) ESZCSM rendelet 3/A. §-a alapján a FoNo VII. orvosi és gyógyszerészi kiadása – az alábbiak szerint – az *Alcoholum dilutum 70%* és a *Pulvis acidi ascorbici 200 mg* vényelőíratokkal egészül ki.

A FoNo VII-nek az OGYÉI jelen közleményével történő módosítása az Egészségügyi Közlönyben történő közzétételt követő 5. naptól alkalmazandó.

A FoNo VII. orvosi kiadása

### **Alcoholum dilutum 70%**

(Alc. dil. 70%)

*Dermatologicum. Antisepticum. Dezinficiens.*

ATC besorolás: D08AX08.

**Javallat:** *az ép vagy enyhén sérült bőrfelület dezinficiálása.*

**Rp.**

**Alcoholi diluti 70%**

grammata quinquaginta (g 50,0)

**D.: ad vitrum fuscum.**

**S.: Külsőleg. Ecsetelésre.**

**Hatóanyag**

**Alcoholum dilutum 70%:** *antisepticum, fertőtlenítő.*

**Mellékhatás:** sérült bőrfelületen csípő érzést okoz.

A FoNo VII. gyógyszerészi kiadása

**Alcoholum dilutum 70%**  
(Alc. dil. 70%)

**Alcoholum dilutum 70%**                      **50,0 g**

**Expedíció**

Jól záró, sötét üvegben.

**Szignatúra**

Külsőleg. Ecsetelésre.

**Dermatologicum. Antisepticum. Dezinficiens.**

**Hatóanyag**

**Alcoholum dilutum 70%:** antisepticum, fertőtlenítő.

**Javallat:** *az ép vagy enyhén sérült bőrfelület dezinficiálása.*

**Mellékhatás:** sérült bőrfelületen csípő érzést okoz.

A FoNo VII. orvosi kiadása

**Pulvis acidi ascorbici 200 mg**  
(Pulv. acid. ascorb. 200 mg)

*Vitamin.*

ATC besorolás: A11GA.

**Javallat:** *C-vitamin hiányos állapot kezelésére, reconvalescenciában, olyan betegek számára, akik a C-vitamin készítmények segédanyagaival szemben túlérzékenyek, vagy nyelési nehézséggel küzdenek.*

**Rp.**

**Acidi ascorbici**

centigrammata viginti (g 0,20)

**Dentur tales doses No quinquaginta (L) ad capsulas cerates, ad scatulam.**

**S.: C vitamin pótlására naponta 1-2 port vízben vagy langyos teában feloldva bevenni.**

**Hatóanyag**

**Acidum ascorbicum:** *antioxidáns, vízdékony vitamin. Folyamatos bevitele szükséges, mivel a szervezet szintetizálni nem tudja. Koenzimként fontos szerepet tölt be a szervezet oxidációs-redukációs folyamataiban.*

**Ellenjavallat:** vesekőbetegség az anamnézisben (magasabb dózisok esetében).

**Figyelmeztetés:** tartós, nagy dózisú alkalmazás hirtelen abbahagyásakor rebound jelenség léphet fel és következményes hiánytünetek jelentkezhetnek. Magasabb dózisok tartós alkalmazásakor megnő a vesekő képződésének kockázata. 14 év alatti életkorban előnyösebb a kisebb egyszeri C-vitamin adagok bevitele, ezért a készítmény alkalmazása nem javasolt.

**Gyógyszerkölsönhatások:** befolyásolhatja más hatóanyagok felszívódását és egyes laboratóriumi vizsgálatok eredményét.

**Mellékhatás:** hasmenés, gyomorirritáció előfordulhat.

**Megjegyzés:** 10,0 g expedíálható osztatlan por formájában, cerátzacskóban, dobozban, 200 mg aszkorbinsav kimérésére alkalmas adagolókanállal. Ebben az esetben a címkeszöveg az alábbiak szerint változik:

**S.: C-vitamin pótlására naponta 1-2 adagolókanálnyi mennyiséget vízben vagy langyos teában feloldva bevenni.**

A FoNo VII. gyógyszerészi kiadása

**Pulvis acidi ascorbici 200 mg**  
(Pulv. acid. ascorb. 200 mg)

**Acidum ascorbicum**                    **10,0 g**  
50 db osztott porra

**Expedíció**

Cerátkapszulában, kartondobozban.

**Szignatúra**

C vitamin pótlására naponta 1-2 port vízben vagy langyos teában feloldva bevenni.

**Vitamin.**

**Hatóanyag**

**Acidum ascorbicum:** *antioxidáns, vízoldékony vitamin. Folyamatos bevitele szükséges, mivel a szervezet szintetizálni nem tudja. Koenzimként fontos szerepet tölt be a szervezetben az oxidációs-redukációs folyamatokban.*

**Javallat:** C-vitamin hiányos állapot kezelésére. Reconvalescenciában, olyan betegek számára, akik a C-vitamin készítmények segédanyagaival szemben túlérzékenyek, vagy nyelési nehézséggel küzdenek.

**Ellenjavallat:** vesekőbetegség az anamnézisben (magasabb dózisok esetében).

**Figyelmeztetés** tartós, nagy dózisu alkalmazás hirtelen abbahagyásakor rebound jelenség léphet fel és következményes hiánytünetek jelentkezhetnek. Magasabb dózisok tartós alkalmazásakor megnő a vesekő képződésének kockázata. 14 év alatti életkorban előnyösebb a kisebb egyszeri C-vitamin adagok bevitele, ezért a készítmény alkalmazása nem javasolt.

**Gyógyszerkölesönhatások:** befolyásolhatja más hatóanyagok felszívódását és egyes laboratóriumi vizsgálatok eredményét.

**Mellékhatás:** hasmenés, gyomorirritáció előfordulhat.

**Megjegyzés:** 10,0 g expediálható osztatlan por formájában, cerátzacskóban, dobozban, 200 mg kimérésére alkalmas adagolókanállal.

Ebben az esetben a **Szignatúra** a következőképpen módosul:

C-vitamin pótlására naponta 1-2 adagolókanálnyi mennyiséget vízben vagy langyos teában feloldva bevenni.