

Az OGYÉI FoNo VII-2/2018. sz. közleménye

a Szabványos Vényminták VII. kiadásának módosításáról

A Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. kiadásának alkalmazásáról szóló 64/2004. (VII. 27.) ESZCSM rendelet 3/A. §-a alapján a FoNo VII. orvosi és gyógyszerészi kiadása a *Solutio merbromini* vényelőirat esetén – az alábbiak szerint – módosul.

A FoNo VII-nek az OGYÉI jelen közleményével történő módosítása az Egészségügyi Közlönyben történő közzétételét követő 5. naptól alkalmazandó.

Orvosi cikkely



Solutio merbromini (Sol. merbromin.)

Dermatologicum. Antisepticum.

ATC besorolás: antiszeptikumok és fertőtlenítők – higanytartalmú készítmények – merkurokrom D08AK04.

Javallat

Bacteriális, gombás bőrfertőzés.

Rp.

Merbromini

gramma semis (g 0,50)

Aquae purificatae

ad grammata viginti quinque (ad g 25,0)

M. f. solutio.

D. ad vitrum fuscum.

S.: Külsőleg. Dezinficiáló ecsetelő. [A pontos adagolást a vényen az orvosnak minden esetben fel kell tüntetnie.]

Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.

Fontos tudnivalók

Csak vényre adható ki. Erős hatású szert tartalmaz. Kizárólag egészségügyi szolgáltató intézményben alkalmazható. Alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha a fertőzés más szerrel nem szüntethető meg. A lehető legkisebb bőrfelületen, legfeljebb néhány napon át alkalmazható.

Hatóanyagok

Merbrominum: *fertőtlenítőszer, szerves higanyvegyület.*

Ellenjavallat

Ismert higany-túlérzékenység.

Figyelmeztetés

A szöveti törmelék gátolhatja a kezelés hatását. Nagyobb vagy hámfosztott területről a hatóanyag felszívódik és a higanymérgezés különböző fokozatait okozhatja (pl. aplasticus anaemia). Nyálkahártyára, szembe, szájba nem kerülhet. Terhesség, szoptatás alatt alkalmazása nem ajánlott.

Kölcsönhatás

Jódos fertőtlenítővel együtt nem alkalmazható.

Mellékhatás

Dermatitis. Túlérzékenységi reakció, contact dermatitis.

Gyógyszerészi cikkely



Solutio merbromini (Sol. merbromin.)

Merbrominum	0,50 g
Aqua purificata	ad 25,0 g

Expedíció

Sötét üvegben vagy műanyag tartályban.

Szignatúra

Külsőleg. Dezinficiáló ecsetelő. [A vényen szereplő adagolás.]

Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.

Dermatologicum. Antisepticum.

ATC besorolás: antiszeptikumok és fertőtlenítők – higanytartalmú készítmények – merkurokrom D08AK04.

Fontos tudnivalók

Csak vényre adható ki. Erős hatású szert tartalmaz. Kizárólag egészségügyi szolgáltató intézményben alkalmazható. Alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha a fertőzés más szerrel nem szüntethető meg. A lehető legkisebb bőrfelületen, legfeljebb néhány napon át alkalmazható.

Hatóanyagok

Merbrominum: *fertőtlenítőszer, szerves higanyvegyület.*

Javallat

Bacteriális, gombás bőrfertőzés.

Figyelmeztetés

A szöveti törmelék gátolhatja a kezelés hatását. Nagyobb vagy hámfosztott területről a hatóanyag felszívódik és a higanymérgezés különböző fokozatait okozhatja (pl. aplasticus anaemia). Nyálkahártyára, szembe, szájba nem kerülhet. Terhesség, szoptatás alatt alkalmazása nem ajánlott.

Kölcsönhatás

Jódos fertőtlenítővel együtt nem alkalmazható.

Mellékhatás

Dermatitis. Túlérzékenységi reakció, contact dermatitis.